

微分・積分

第7回「微分とグラフ」

萩野 達也

hagino@sfc.keio.ac.jp


<https://vu5.sfc.keio.ac.jp/slide/>

今日の内容

- 微分法の応用に関して解説する.
 1. 接線と法線の方程式
 2. 極値問題, 凹凸, 2次導関数
 3. ロピタルの定理

関数の増加・減少

- 関数 $f(x)$ が a で微分可能とは、点 $(a, f(a))$ の近傍で $f(x)$ のグラフが直線で近似可能であること意味する。
- その直線の傾きは微分係数 $f'(a)$ で与えられる。
- 関数のグラフが直線であれば、関数の増加・減少はその傾きの正負で簡単に判定できる。
- そのため、関数を微分することにより、その関数がどの範囲で増加・減少しているかを解析することが可能になる。



接線

定義7.1


- 関数 $f(x)$ が a で微分可能であるとする.
- 点 $(a, f(a))$ を通る, 傾き $f'(a)$ の直線を, $y = f(x)$ のグラフの $(a, f(a))$ における**接線**という.
- 具体的に式で書くと

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

- 式を整理して

$$y = f'(a)x + f(a) - f'(a)a$$

と書くこともできる.



接線(例)

例7.2

- 関数 $f(x) = x^2 - x - 3$ のグラフの $(2, f(2))$ における接線を求める.
- 導関数は $f'(x) = 2x - 1$ である.
- $f(2) = -1, f'(2) = 3$ より, 接線の方程式は

$$y - (-1) = 3(x - 2)$$

- つまり

$$y = 3x - 7$$

法線

定義7.3

- 関数 $f(x)$ が a で微分可能であるとする.
- 点 $(a, f(a))$ において, $y = f(x)$ のグラフの接線と直交する直線を **法線**という.
- 具体的に式で書くと


$$y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a)$$

- 式を整理して

$$y = -\frac{1}{f'(a)}x + f(a) + \frac{a}{f'(a)}$$

と書くこともできる.

- 傾きが s と t の直線が直交する条件は $st = -1$ である. (非自明)



法線(例)

例7.4

- 関数 $f(x) = x^2 - x - 3$ のグラフの $(2, f(2))$ における法線を求める.
- 導関数は $f'(x) = 2x - 1$ である.
- $f(2) = -1, f'(2) = 3$ より, 法線の方程式は

$$y - (-1) = -\frac{1}{3}(x - 2)$$

- つまり

$$y = -\frac{1}{3}x - \frac{1}{3}$$

接線・法線(問題)

問題7.5

- 関数 $f(x) = x^3 - x^2 - 3$ のグラフの $(2, f(2))$ における接線と法線を求めよ.

単調増加・単調減少

定義7.6

- 関数 $f(x)$ は

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$$

を満たすとき、**単調増加**と呼ばれ、

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$$

を満たすとき、**単調減少**と呼ばれる。

- \leq を $<$ に置き換えた条件を満たすとき、**狭義単調増加**と呼ばれ、
- \geq を $>$ に置き換えた条件を満たすとき、**狭義単調減少**と呼ばれる。

単調増加・単調減少

- 関数の増減と微分に関して、次の関係は基本的である。


定理7.7

- 関数 $f(x)$ が微分可能であるとする。
 - $f'(x) \geq 0$ ならば $f(x)$ は単調増加.
 - $f'(x) > 0$ ならば $f(x)$ は狭義単調増加.
 - $f'(x) \leq 0$ ならば $f(x)$ は単調減少.
 - $f'(x) < 0$ ならば $f(x)$ は狭義単調減少.
 - $f'(x) = 0$ ならば $f(x)$ は定数.
- 微分係数が接線の傾きを与えていることを思い出せば、直感的に理解しやすい。

極大・極小

定義7.8

- 関数 $f(x)$ は a の近傍 (a を含む小さな开区間) において
 - $x < a$ で単調増加, $x > a$ で単調減少となるとき, $f(x)$ は a で**極大**であるといい, $f(a)$ を**極大値**という.
 - $x < a$ で単調減少, $x > a$ で単調増加となるとき, $f(x)$ は a で**極小**であるといい, $f(a)$ を**極小値**という.
 - 極値**: 極大値と極小値, **極値問題**: 極値を求める問題
-
- 関数の最大値と最小値は, それぞれ極大値と極小値.



ワイエルシュトラスの定理

定理7.9(ワイエルシュトラスの定理)

- 関数 $f(x)$ が $[a, b]$ で連続であるとき, $c, d \in [a, b]$ が存在して, 任意の $x \in [a, b]$ に対して

$$f(x) \leq f(c), \quad f(d) \leq f(x)$$

- つまり, $f(x)$ は $[a, b]$ において, c で最大値 $f(c)$, d で最小値 $f(d)$ をとる.

- この定理は関数が具体的にどこで最大値と最小値をとるかについてまでは教えてくれない.
- 連続性を仮定するのはなぜだろうか?

停留点

定義7.10

- 関数 $f(x)$ が微分可能であるとき, $f'(a) = 0$ となる a を $f(x)$ の **停留点** という.
- $f(x)$ が a で極大・極小であれば a は $f(x)$ の停留点である.
 - 極大: $f'(x)$ の符号が a で正から負に変化
 - 極小: $f'(x)$ の符号が a で負から正に変化
- 停留点は必ずしも極大・極小とは限らない.
- 実際, $f(x) = x^3$ の停留点 $a = 0$ は極大でも極小でもない.
- 極値問題では, 導関数を計算して停留点を求め, それが極大・極小を与えているか確認する, という方法をとる.

増減表

- 関数の増減と極値に関してまとめた表を増減表という。

例7.11

- $f(x) = 2x^2 + 8x + 13$ に関して, 導関数は

$$f'(x) = 4x + 8 = 4(x + 2)$$

- $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x < -2$
- $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -2$
- $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > -2$
- 増減表

x	...	-2	...
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	↘	5	↗

増減表(問題)

問題7.12

• $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 6$ に関して, 増減表を書きなさい.

• 増減表

x					
$f'(x)$					
$f(x)$					

関数の凹凸

定義7.13



• 开区間 (a, b) において, 関数 $f(x)$ が

1. **下に凸**: 任意の $x_1, x_2 \in (a, b)$ と $0 \leq \lambda \leq 1$ に対して

$$\lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2) \geq f(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2)$$

1. **上に凸**: 任意の $x_1, x_2 \in (a, b)$ と $0 \leq \lambda \leq 1$ に対して

$$\lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2) \leq f(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2)$$




• 点 p, q に対して, $\lambda p + (1 - \lambda) q$ は区間 $[p, q]$ を $\lambda : (1 - \lambda)$ に内分する点.

変曲点

定義7.14

- その点の左右で上に凸と下に凸が切り替わるような点を**変曲点**という.



2次導関数

- 関数の増減は微分することで判定できた.
- 次に関数の凹凸は2回微分することで判定できることを説明する.


定義7.15

- 関数 $f(x)$ の導関数 $f'(x)$ も微分可能であるとき, $f(x)$ は**2回微分可能**であるという.
 - $f'(x)$ の導関数を $f''(x)$ と書き, $f(x)$ の**2次導関数**と呼ぶ.
-
- $f(x)$ が位置を表すとき
 - $f'(x)$ は速度 (=位置の変化率),
 - $f''(x)$ は加速度 (=速度の変化率)を表す.

2次導関数

定理7.16

- $f(x)$ は2回微分可能とする.
- 1. $f''(x) > 0$ ならば $f(x)$ は下に凸.
- 2. $f''(x) < 0$ ならば $f(x)$ は上に凸.
- 3. 変曲点 a は2回微分の符号が変化する点. 特に, $f''(a) = 0$



- $f''(x) > 0$ は接線の傾きが増加すること, $f''(x) < 0$ は接線の傾きが減少することを意味する.

正規分布の変曲点

例7.17

- 正数 $a > 0$ に関して, $f(x) = e^{-ax^2}$ の変曲点を求める.

$$f'(x) = -2ax e^{-ax^2}$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= -2a e^{-ax^2} + (-2ax)^2 e^{-ax^2} \\ &= 2a e^{-ax^2} (2ax^2 - 1) \end{aligned}$$




- これより, $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2a}}$ が変曲点.
- 特に, $a = \frac{1}{2\sigma^2}$ とすると, $x = \pm\sigma$ が変曲点.

正規分布の変曲点(発展)

定理7.18

- 正規分布の確立密度関数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ の変曲点は $x = \mu \pm \sigma$.

- σ は正規分布の**標準偏差**と呼ばれる。



面積の割合

$\sigma = 68\%$

$2\sigma = 95\%$

$3\sigma = 99.7\%$

2次導関数

- 停留点は極値とは限らなかったが、2次導関数を使うことで、極大・極小についての判定が可能となる。

定理7.19

- $f(x)$ は2回微分可能とする。
 1. $f'(a) = 0$ かつ $f''(a) > 0$ ならば、 $f(x)$ は a において極小。
 2. $f'(a) = 0$ かつ $f''(a) < 0$ ならば、 $f(x)$ は a において極大。
- $f'(a) = f''(a) = 0$ である場合には、この定理からは何もわからない。
- 実際、 $f(x) = x^3$ に関して、 $f'(0) = f''(0) = 0$ であり、 $f(x)$ は原点 0 において極値を取らない。

増減凹凸表

- 増減凹凸表: 関数の増減, 凹凸, 極値に関してまとめた表

例7.20

- $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 6$ に関して,

$$f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x + 3)(x - 1)$$

$$f''(x) = 6x + 6 = 6(x + 1)$$

- これにより $f(x)$ の増減凹凸表は次で与えられる.

x	...	-3	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	-	-	0	+
$f''(x)$	-	-	-	0	+	+	+
$f(x)$	↷	33	↘	17	↘	1	↗



最適化問題

例7.22

• 等周問題: 周の長さが l の長方形の中で面積を最大にするものは?

• 面積 $A(x) = x(l/2 - x)$

$$A'(x) = \frac{l}{2} - 2x \qquad A''(x) = -2$$



ロピタルの定理

- 微分は不定形の極限を計算する強力な手法を与える。

定理7.23(ロピタルの定理)

- 関数 $f(x), g(x)$ が a を除く a の近傍において微分可能であり,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

かつ, $g'(x) \neq 0$ とする。

- このとき, 極限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ が存在するならば

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

- ロピタルの定理は, $a = \pm\infty$ や $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty$ の場合も成り立つ。
- 証明は次回行う。

ロピタルの定理(問題)

問題7.24

- 次の極限を計算せよ.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{x-1}$

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10^{10}x}{e^x}$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$

- ロピタルの定理を使う際には, 仮定に注意すること.

まとめ

1. 接線と法線の方程式
2. 極値問題, 凹凸, 2次導関数
3. ロピタルの定理