

表4 . 位置ごとの出現種

種名	学名	周縁部において占める位置			
		堤体	上	中	下
ヨモギ	<i>Artemisia princeps</i>	11	19	1	0
ギョウギシバ	<i>Cynodon dactylon</i>	19	7	7	10
クズ	<i>Pueraria lobata</i>	14	13	15	0
セイトカアワダチ	<i>Solidago altissima</i>	9	10	6	0
アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i>	1	1	1	1
メリケンガムシ	<i>Andropogon virginicus</i>	12	12	12	0
メヒシバ	<i>Digitaria ciliaris</i>	6	4	1	2
ヤハズエンドウ	<i>Vicia sativa</i>	0	1	1	0
カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i>	0	1	1	0
ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i>	1	0	3	1
エノコログサ	<i>Setaria viridis</i>	8	0	0	0
コツブキンエノコロ	<i>Setaria glauca</i>	0	1	1	3
ツリガネニンジン	<i>Adenophora triphylla</i> var. <i>japonica</i>	2	1	0	0
イヌビエ	<i>Echinochloa Crus-galli</i>	0	0	4	10
ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i>	7	1	1	0
ヤハズ	<i>Kummerovia striata</i>	1	1	1	0
ヒメクグ	<i>Cyperus brevifolius</i> var. <i>leiolepis</i>	0	0	1	0
シスズメノヒエ	<i>Paspalum dilatatum</i>	1	1	0	0
スイバ	<i>Rumex acetosa</i>	1	0	0	0
スギナ	<i>Equisetum arvense</i>	0	0	1	14
ケネザサ	<i>Pleibolatus fortunei</i> f. <i>pubescens</i>	0	0	0	0
コツナギ	<i>Indigofera pseudo-tinctoria</i>	3	0	0	0
ヌカキビ	<i>Panicum bisulcatum</i>	0	0	7	6
ヨシ	<i>Phragmites communis</i>	0	0	6	7
タカサブロウ	<i>Eclipta prostrata</i>	0	0	0	0
カゼクサ	<i>Eragrostis ferruginea</i>	1	0	0	0
イヌタデ	<i>Polygonum longisetum</i>	0	0	0	0
コゴメカヤツリ	<i>Cyperus iria</i>	0	0	1	0
ムラサキエノコロ	<i>Setaria viridis</i> f. <i>misera</i>	0	0	0	0
イ	<i>Juncus effusus</i>	0	0	4	0
ケイヌビエ	<i>Echinochloa Crus-galli</i> var. <i>caudata</i>	0	0	0	1
シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i>	0	0	0	0
アゼガヤ	<i>Leptochloa chinensis</i>	0	0	0	4
スズメノエンドウ	<i>Vicia hirsuta</i>	0	0	0	0